



## **SoftBiopsy** - Eche un Vistazo (Take a Look)

Muestras de citología:

raramente Podemos inspeccionar el dispositivo antes de la colocación en el líquido fijador. Prevención del cáncer cervicouterino involucra el cribado con dispositivos de muestreo cervical que incluyen espátulas, escobas o cepillos. Todos pueden ser u para cytolog sed hombre pruebas de virus del papiloma, o pruebas moleculares. El practica ha sido habitual durante muchos años. Celdas eliminado no son manifiestamente evidente sobre los dispositivos y a menudo mezclado con mucosa, sangre y suciedad. No hay costumbre de inspeccionar el cepillo oabitaciones para ejemplar adecuación en la cabecera; confiamos en la pathologia análisis de laboratorio para certificar el espécimen adequ comió durante el diagnóstico.

Eche un vistazo- Colposcopia compasivo ® & histología Ectocervical endocervical de cerda pinces y dispositivos basado de tela.

Inspeccione los cepillos para asegurar que se obtiene una muestra adecuada inspección de las cerdas o gancho para matrices de tejido atrapado antes de la colocación en el fijador vial.

Tejido endocervical para dispositivos basados en el gancho array debe llenar completamente cuando se utiliza según el prospecto y el ajuste correcto de orientación o presión sobre la mucosa endocervical durante la rotación. Para ectocervical biopsy friccional con presión suficiente la rotation dispositivo deben llenar dentro de dos aplicaciones (sitios) en el cuello uterino. Sugerencia para inspeccionar el dispositivo suficiente tejido atrapado antes de la colocación en el vial

Histologics™, LLC | 4095 E. La Palma Ave., Suite N, Anaheim, CA 92807 USA  
Phone / Fax: 888-738-9757 | [histologics@gmail.com](mailto:histologics@gmail.com)  
2008-2018 Copyright © Histologics™, LLC | All rights reserved.